Aufgabe 12: Sei K ein Doppelkegel mit einem Öffnungswinkel von 90° , vom Ursprung aus in z-Richtung geöffnet.

a) Geben Sie eine Funktion $g:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}$ zur impliziten Darstellung von K an:

$$K = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : g(x, y, z) = 0\}$$

- b) Wo ist K eine stetig differenzierbare Fläche?
- c) Wo lässt sich K lokal als Graph über der xy-Ebene darstellen?
- d) Wo lässt sich K lokal als Graph über der yz-Ebene darstellen?

LÖSUNG:

a) Betrachtet man den Schnitt des Kegels mit einer Ebene parallel zur xy-Ebene in der Höhe z, so erhält man einen Kreis mit Radius |z|, d.h. es gilt stets $x^2 + y^2 = z^2$. Man definiert also

$$g(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2 = 0.$$

und damit ist

$$K = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : g(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2 = 0\}.$$

b) K ist stetig differenzierbar überall dort, wo Rang(Dg)=1, also $\nabla g\neq 0$. Das heißt:

$$2 \begin{pmatrix} x \\ y \\ -z \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

K ist also überall außer in $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ eine stetig differenzierbare zweidimensionale Fläche im $\mathbb{R}^3.$

- c) Nach der Satz von implizite Funktionen lässt sich K überall dort lokal als Graph über der xy-Ebene darstellen, wo $\frac{\partial g}{\partial z} = -2z \neq 0$. Falls z = 0, so ergibt sich $x^2 + y^2 = 0$, also x = y = 0. K lässt sich also nur in $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ nicht lokal als Graph über der xy-Ebene darstellen.
- d) Nach der Satz von implizite Funktionen lässt sich K überall dort lokal als Graph über der yz-Ebene darstellen, wo $\frac{\partial g}{\partial x} = 2x \neq 0$. Falls x = 0, so ergibt sich $y^2 z^2 = 0$, also $y = \pm z$. K lässt sich also überall außer auf den beiden Geraden $\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ \alpha \\ \pm \alpha \end{pmatrix} \middle| \alpha \in \mathbb{R} \right\}$ lokal als Graph über der yz-Ebene darstellen.